



Station 3 : การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย (Flushing) ที่ใส่สายสวนค้ำไว้
ทักษะที่ต้องการประเมิน Technical skill

เวลาในการปฏิบัติ 5 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 70 คะแนน

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความสามารถในการทำทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายที่ใส่สายสวนปัสสาวะค้ำไว้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

- | | |
|--|--------|
| 1. ถาดใส่อุปกรณ์ | 1 ใบ |
| 2. อุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย | |
| - ถ้วยเล็กใส่สำลี | 8 ก้อน |
| - น้ำยาทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ (Normal saline, Sterile water, Savlon 1:100) | 1 ขวด |
| - Non-tooth forceps | 1 อัน |
| - ถุงมือสะอาด | 1 คู่ |
| 3. หุ่นเพศชายที่ใส่สายสวนปัสสาวะไว้เรียบร้อยแล้ว | 1 ตัว |

คำสั่ง

จงทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ที่ใส่สายสวนค้ำไว้ในเพศชาย กับหุ่นเสมือนกับการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง



แบบประเมินการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย (Flushing) ที่ใส่สายสวนค้างไว้ใน

ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่.....

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
1. แนะนำตัวโดยบอกชื่อ สกุล เป็นนักศึกษาผู้ช่วย พยาบาล และบอกผู้ป่วยว่าจะทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	5	3 ปฏิบัติ อย่างใด อย่างหนึ่ง	0
2. กั้นม่านให้มิดชิด	5		0
3. จัดท่านอนหงายราบแยกขาออก	5		0
4. ดึงกางเกงผู้ป่วยลงล่าง เปิดเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์	5		0
5. เทน้ำยาทำความสะอาดลงบนสำลีที่บรรจุในถ้วย ปริมาณที่เหมาะสม	5		0
6. หยิบถ้วยเล็กที่ใส่สำลีมาใกล้ตัวผู้ป่วย ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการหยิบใช้และสวมถุงมือ	5		0
7. จับส่วนองคชาติขึ้น ร่นหนังหุ้มปลายลง	10		0
8. ใช้ Forceps คีบสำลีที่มีน้ำยาเช็ดทำความสะอาด จากรูเปิดท่อปัสสาวะแล้ววนรอบองคชาติไปทางเดียวจนถึงโคนองคชาติ	15		0
9. ใช้ Forceps คีบสำลีที่มีน้ำยาเช็ดทำความสะอาด โดยใช้หลักการเช็ดจากด้านใกล้ตัวมาด้านใกล้ตัว จากบนลงล่าง ไม่ข้ามของสะอาด	15		0
10. ใช้ Forceps คีบสำลีที่มีน้ำยาเช็ดทำความสะอาดสายสวนปัสสาวะโดยเช็ดวนรอบสายสวนจากรูเปิดท่อปัสสาวะออกไปประมาณ 2 นิ้ว	10		0
11. ใช้ Forceps คีบสำลีแห้งซับบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ให้แห้ง และดึงหนังหุ้มปลายองคชาติกลับเข้าที่	15		0
12. ใส่กางเกงและจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบาย	5		0
คะแนนที่ได้.....	คะแนนเต็ม 100 คะแนน		

ข้อเสนอแนะ.....

.....
(.....)

นักศึกษาผู้สอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

.....
(.....)

อาจารย์ผู้ประเมิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



การคิดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ (MPL)

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
1. แนะนำตัวโดยบอกชื่อ สกุล เป็นนักศึกษาผู้ช่วย พยาบาล และบอกผู้ป่วยว่าจะทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์	5	3 ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง	0
2. กั้นม่านให้มิดชิด	5		0
3. จัดท่านอนหงายราบแยกขาออก	5		0
4. ดึงกางเกงผู้ป่วยลงล่าง เปิดเฉพาะบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์	5		0
5. เทน้ำยาทำความสะอาดลงบนสำลีที่บรรจุในถ้วย ปริมาณที่เหมาะสม	5		0
6. หยิบถ้วยเล็กที่ใส่สำลีมาใกล้ตัวผู้ป่วย ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการหยิบใช้และสวมถุงมือ	5		0
7. จับส่วนองคชาติขึ้น รันหนังหุ้มปลายลง	10		0
8. ใช้ Forceps คีบสำลีที่มีน้ำยาเช็ดทำความสะอาด จากรูเปิดท่อปัสสาวะแล้ววนรอบองคชาติไปทางเดียวจนถึงโคนองคชาติ	15		0
9. ใช้ Forceps คีบสำลีที่มีน้ำยาเช็ดทำความสะอาด โดยใช้หลักการเช็ดจากด้านใกล้ตัวมาด้านใกล้ตัว จากบนลงล่าง ไม่ข้ามของสะอาด	15		0
10. ใช้ Forceps คีบสำลีที่มีน้ำยาเช็ดทำความสะอาดสายสวน ปัสสาวะโดยเช็ดวนรอบสายสวนจากรูเปิดท่อปัสสาวะออกไปประมาณ 2 นิ้ว	10		0
11. ใช้ Forceps คีบสำลีแห้งซับบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ให้แห้ง และดึงหนังหุ้มปลายองคชาติกลับเข้าที่	15		0
12. ใส่กางเกงและจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบาย	5		0
รวมคะแนน MPL	70 คะแนน		