



Station 11 : การให้อาหารทางสายยาง (Nasogastric tube)

ทักษะที่ต้องการประเมิน Technical skill

เวลาในการปฏิบัติ 5 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 75 คะแนน

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความสามารถในการให้อาหารทางสายยาง

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

- | | |
|---|--------|
| 1. ถาดใส่อุปกรณ์ | 1 ใบ |
| - Asepto syringe ขนาด 50 มิลลิลิตร | 1 อัน |
| - เขี่ยกบบรรจุอาหารปั่นสำหรับผู้ป่วย เขียนฉลากติดว่าอาหารปั่น | 1 ใบ |
| - เขี่ยกบหรือภาชนะบรรจุน้ำดื่มมากกว่า 50 มิลลิลิตร | 1 ใบ |
| - สำลีชุบน้ำต้มสุก | 2 ก้อน |
| 2. Stethoscope | 1 อัน |
| 3. ฟันที่ใส่สายยางกระเพาะอาหารทางจมูกไว้แล้ว | 1 ตัว |

* เตรียมผู้ช่วย 1 คน สำหรับเปลี่ยนกระเพาะอาหาร

โจทย์ ผู้ป่วยอายุ 50 ปี แพทย์ให้อาหารปั่น BD 1:1 จำนวน 200 มิลลิลิตร วันละ 4 มื้อ และให้น้ำ
หลังอาหาร 50 มิลลิลิตร

คำสั่ง

จงแสดงการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย โดยถือเสมือนการปฏิบัติกับผู้ป่วยจริง (ท่านได้ล้าง
มือพร้อมทั้งตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และผู้ป่วยนอนหงายศีรษะสูง 45 องศาแล้ว)



แบบประเมินการให้อาหารทางสายยาง(Nasogastric tube: NG tube)

ชื่อ.....นามสกุล.....เลขที่.....

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
1. บอกให้ผู้ป่วยทราบว่าให้อาหารทางสายยาง	5		0
2. เช็ดรูเปิดและด้านนอกของสายให้อาหารด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุก	5		0
3. ทดสอบตำแหน่งของสายยางในกระเพาะอาหาร โดยดูด gastric content	15		0
4. ใช้ Stethoscope ฟังเสียงลมที่ตำแหน่งใต้ลิ้นปี่เอียงมาทางด้านซ้าย โดยใช้ Syringe ดันลมเข้าไปในสายยาง ประมาณ 10 มิลลิลิตร และดูดลมออกจากกระเพาะอาหาร	10		0
5. เริ่มให้อาหารปั่นโดยรินอาหารลงใน syringe อย่างต่อเนื่องไม่ให้อากาศเข้าโดยรินไม่เกิน 50 มิลลิลิตร ถือกระบอกฉีดยาไม่สูงเกิน 1 ฟุตครึ่ง (เมื่อนักศึกษาให้อาหารใกล้หมด 1 syringe ผู้คุมสอบบอกว่าให้ทำขั้นตอนต่อไปได้เลย)	15		0
6. พับสายยางแล้วรินน้ำตาม 50 มิลลิลิตรเมื่ออาหารเกือบหมด Syringe	10		0
7. พับสายยางแล้วปลด Syringe ออกจากสาย	5		0
8. เช็ดรูเปิดและด้านนอกของสายให้อาหารด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุก ปิดรูเปิดให้อาหาร	5		
9. จัดท่านอนตะแคงขวาศีรษะสูง 45 องศา หรือท่านอนหงายศีรษะสูงเดิมต่อหลังให้อาหาร 30 นาทีขึ้นไป (ผู้คุมสอบถามต้องจัดท่านอนเดิมนานเท่าไร)	10		0
คะแนนที่ได้.....	คะแนนเต็ม 100 คะแนน		

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....

(.....)

นักศึกษาผู้สอบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(.....)

อาจารย์ผู้ประเมิน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....



การคิดเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ (MPL)

รายการประเมิน	ปฏิบัติ		ไม่ปฏิบัติ
	สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์	
1. บอกให้ผู้ป่วยทราบว่าให้อาหารทางสายยาง	5		0
2. เช็ดรูเปิดและด้านนอกของสายให้อาหารด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุก	10		0
3. ทดสอบตำแหน่งของสายยางในกระเพาะอาหาร โดยดูด Gastric content	5		0
4. ใช้ Stethoscope ฟังเสียงลมที่ตำแหน่งใต้ลิ้นปี่เยื้องมาทางด้านซ้าย โดยใช้ Syringe ดันลมเข้าไปในสายยางประมาณ 10 มิลลิลิตร และดูดลมออกจากกระเพาะอาหาร	15		0
5. เริ่มให้อาหารปั่นโดยรินอาหารลงใน syringe อย่างต่อเนื่องไม่ให้อากาศเข้าโดยรินไม่เกิน 50 มิลลิลิตร ถือกะบอกฉีดยา ไม่สูงเกิน 1 ฟุตครึ่ง (เมื่อนักศึกษาให้อาหารใกล้หมด 1 syringe ผู้คุมสอบบอกว่าให้ทำขั้นตอนต่อไปได้เลย)	30		0
6. พับสายยางแล้วรินน้ำตาม 50 มิลลิลิตรเมื่ออาหารเกือบหมด Syringe	10		0
7. พับสายยางแล้วปลด Syringe ออกจากสาย	10		0
8. เช็ดรูเปิดและด้านนอกของสายให้อาหารด้วยสำลีชุบน้ำต้มสุก ปิดรูเปิดให้อาหาร	5		
9. จัดท่านอนตะแคงขวาศีรษะสูง 45 องศา หรือท่านอนหงาย ศีรษะสูงเดิมต่อหลังให้อาหาร 30 นาทีขึ้นไป (ผู้คุมสอบถามต้องจัดท่านอนเดิมนานเท่าไร)	10		0
รวมคะแนน MPL	75 คะแนน		